

В.С. ШУХОВ, Е.Н. БАЙБАРИНА, И.И. РЮМИНА, В.В. ЗУБКОВ

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2016

ТЕРАПИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ/СОСТОЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ (L00, L01, L08, B95)	
Импетиго у новорожденных (L00, L01)	Оксациллин (в/в): <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней
Инфекция у новорожденных, вызванная <i>Streptococcus spp.</i> (L08, B95)	Бензилпенициллин (в/в, в/м): <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте с 7 до 28 дней каждые 8 ч в течение 5–7 дней
Инфекция у новорожденных, вызванная <i>Staphylococcus spp.</i> (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i>) (L08, B95)	Оксациллин (в/в): <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней. Примечание: при диагностированном метициллинрезистентном <i>Staphylococcus</i> — ванкомицин (в/в) 15 мг/кг каждые 8 ч в течение 7–14 дней
ИНФЕКЦИИ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ (M00, M86)	
Пиогенный артрит у новорожденных (стартовая эмпирическая терапия) (M00)	Оксациллин (в/в, в/м): <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней. В сочетании с цефотаксимом (в/в, в/м): <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней
Пиогенный артрит у новорожденных, вызванный <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (M00)	Цефтриаксон (в/в, в/м): <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 24 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 дней каждые 24 ч в течение 7–10 дней

Продолжение табл.

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ (M00, M86)	
Остеомиелит у новорожденных (возбудитель не идентифицирован) (M86)	<p>Оксациллин (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней. <p>В сочетании с цефотаксимом (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней. Продолжать терапию приемом амоксциллина/клавулановой кислоты (внутри) 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 7–10 дней
Остеомиелит у новорожденных, вызванный <i>Staphylococcus aureus</i> (M86)	<p>Оксациллин (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней. <p>В сочетании с цефотаксимом (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней
Остеомиелит у новорожденных, вызванный <i>Salmonella spp.</i> (M86)	<p>Оксациллин (в/в медленно в течение 10 мин, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней. <p>В сочетании с цефотаксимом (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней
ИНФЕКЦИИ ГЛАЗ (A74, B30, H10, H13)	
Конъюнктивит вирусный (<i>Herpes simplex, adenovirus</i>) у новорожденных (B30)	<p>Ацикловир (в/в):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 7 дней

Продолжение табл.

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ ГЛАЗ (А74, В30, Н10, Н13)	
<p>Конъюнктивит бактериальный (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) у новорожденных (Н10, Н13)</p>	<p>Цефотаксим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней <p>или</p> <p>Цефтриаксон (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 24 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 дней каждые 24 ч в течение 7–10 дней
<p>Конъюнктивит бактериальный (<i>Staphylococcus aureus</i>) у новорожденных (Н13)</p>	<p>Оксациллин (в/в):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 5–7 дней
<p>Конъюнктивит бактериальный (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) у новорожденных (Н13)</p>	<p>Цефтазидим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 24 ч; • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 12 ч; • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 8 ч в течение 7–10 дней. <p>В сочетании с гентамицином:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (в/в, в/м) 3,5–5 мг/кг каждые 24 ч в течение 7–10 дней
ИНФЕКЦИИ ЛОР-ОРГАНОВ (Н66, Н67)	
<p>Средний отит у новорожденных (стартовая эмпирическая терапия) (Н66, Н67)</p>	<p>Цефотаксим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней <p>или</p> <p>Амоксициллин/клавулановая кислота (внутри):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 7–10 дней

Продолжение табл.

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ ЛОР-ОРГАНОВ (Н66, Н67)	
Средний отит у новорожденных, вызванный <i>Enterobacter spp.</i> (Н66, Н67)	<p>Цефотаксим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней <p>или</p> <p>Амоксициллин/клавулановая кислота (в/в, внутрь):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 7–10 дней
Средний отит у новорожденных, вызванный <i>Staphylococcus aureus</i> (Н66, Н67)	<p>Оксациллин (в/в):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг каждые 8 ч в течение 10 дней
Средний отит у новорожденных, вызванный <i>Streptococcus pneumoniae</i> , β-гемолитическим стрептококком гр. А (Н66, Н67)	<p>Бензилпенициллин (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 28 дней каждые 8 ч в течение 10 дней
Средний отит у новорожденных, вызванный <i>Haemophilus influenzae</i> (Н66, Н67)	<p>Амоксициллин/клавулановая кислота (внутри):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 10 дней
ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (J18, P23, P24)	
Пневмония у новорожденных внегоспитальная (P24, J18)	<p>Ампициллин (в/в):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50–100 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 50–100 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 50–100 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6 ч в течение 7–10 дней. <p>В сочетании с гентамицином (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,5–5 мг/кг каждые 24 ч в течение 7–10 дней <p>или</p>

Продолжение табл.

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ	ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (J18, P23, P24)	
	<p>Цефотаксим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 25 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6–8 ч в течение 7–10 дней <p>или</p> <p>Цефтриаксон (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 24 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 дней каждые 24 ч в течение 7–10 дней
<p>Пневмония у новорожденных, вызванная <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (P23.5)</p>	<p>Цефтазидим (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 24 ч; • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 12 ч; • 25–50 мг/кг новорожденным в возрасте от 21 до 28 дней каждые 8 ч в течение 7 дней. <p>В сочетании с гентамицином:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (в/в, в/м) 3,5–5 мг/кг каждые 24 ч в течение 7 дней
<p>Пневмония у новорожденных, вызванная <i>Streptococcus</i> (серогр. В) (P23.3)</p>	<p>Бензилпенициллин (в/в, в/м):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 75 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 28 дней каждые 8 ч в течение 7–10 дней <p>или</p> <p>Ампициллин (в/в):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50–100 мг/кг новорожденным в возрасте до 7 дней каждые 12 ч; • 50–100 мг/кг новорожденным в возрасте от 7 до 21 дня каждые 8 ч; • 50–100 мг/кг детям в возрасте от 21 до 28 дней каждые 6 ч в течение 7–10 дней